



Studie: Schwangerschaft und Post-Covid-Müdigkeit

Die Studie untersucht die Prävalenz, Dauer und Risikofaktoren für postvirale Müdigkeit bei schwangeren Frauen, die an Covid-19 erkrankt sind. Die Forscher untersuchten drei Gruppen schwangerer Frauen und fanden heraus, dass das Risiko und die Dauer der Müdigkeit mit der Schwere der Covid-19-Infektion zusammenhängen. Frauen mit schweren Fällen von Covid-19 hatten ein höheres Risiko für Müdigkeit. Insgesamt ist die Müdigkeit bei Frauen, die an Covid-19 erkrankt sind, sechs Wochen, drei Monate und sechs Monate nach der Diagnose zurückgegangen. Details der Studie: Dieser Artikel ist Teil unserer Sonderausgabe „Immune Health“ vom Mai 2023. Laden Sie hier die vollständige Ausgabe herunter. Referenz Oliviera …



Die Studie untersucht die Prävalenz, Dauer und Risikofaktoren für postvirale Müdigkeit bei schwangeren Frauen, die an Covid-19 erkrankt sind. Die Forscher untersuchten drei Gruppen schwangerer Frauen und fanden heraus, dass das Risiko und die Dauer der Müdigkeit mit der Schwere der Covid-19-Infektion

zusammenhängen. Frauen mit schweren Fällen von Covid-19 hatten ein höheres Risiko für Müdigkeit. Insgesamt ist die Müdigkeit bei Frauen, die an Covid-19 erkrankt sind, sechs Wochen, drei Monate und sechs Monate nach der Diagnose zurückgegangen.

Details der Studie:

*Dieser Artikel ist Teil unserer Sonderausgabe „Immune Health“ vom Mai 2023. **Laden Sie hier die vollständige Ausgabe herunter.***

Referenz

Oliviera AMDSS, Carvahlo MA, Nacul L, et al. Postvirale Müdigkeit nach einer SARS-CoV-2-Infektion während der Schwangerschaft: eine longitudinale Vergleichsstudie. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(23):15735.

Studienziel

Bestimmung der Prävalenz, Dauer und Risikofaktoren postviraler Müdigkeit bei schwangeren Frauen mit SARS-CoV-2

Schlüssel zum Mitnehmen

Das Risiko und die Dauer einer Post-Covid-Müdigkeit während der Schwangerschaft steigen mit der Schwere der Infektion.

Design

Teilnehmer

Die Forscher untersuchten drei Gruppen schwangerer Frauen (N=588):

- Gruppe 1 (G1): Frauen, bei denen während der Schwangerschaft eine Covid-19-Infektion diagnostiziert wurde (n=259)
- Gruppe 2 (G2): Frauen, die während der Schwangerschaft nicht auf Covid-19 getestet wurden und bei der Entbindung eine positive Covid-19-Serologie aufwiesen (n=131)
- Gruppe 3 (G3): Frauen, die während der Schwangerschaft nicht getestet wurden und bei der Entbindung eine negative Serologie aufwiesen (n=198)

Frauen, die gegen Covid-19 geimpft waren, wurden von der Studie ausgeschlossen.

Bewertete Studienparameter

Alle Frauen erhielten Fragebögen zur Beurteilung der Müdigkeit bei der Entbindung sowie 6 Wochen, 3 Monate und 6 Monate nach der Entbindung. Gruppe 1 erhielt außerdem Fragebögen 6 Wochen, 3 Monate und 6 Monate nach der Covid-19-Diagnose. Die Ermittler überprüften die geburtshilflichen Diagramme auf ihre Krankengeschichte.

Der Fragebogen ermittelte das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von geistiger oder körperlicher Müdigkeit, Schmerzen und dem Verlust normaler Aktivität. Für Frauen mit „erheblicher Müdigkeit“ gaben die Forscher einen Folgefragebogen aus, um die Symptome besser zu verstehen.

Dadurch wurden weitere Daten zu Komorbiditäten oder anderen möglichen Ursachen für Müdigkeit gesammelt.

Müdigkeit und damit verbundene Symptome wurden auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Wenn eine Frau angab, sich in mehr als 50 % der Fälle müde zu fühlen, wurde dies als „meistens Müdigkeit“ bezeichnet, und wenn sie auch angab, weniger als 50 % ihrer Zeit leisten zu können. Die Hälfte ihrer normalen Aktivitäten wurde als „erhebliche Müdigkeit“ angesehen.

Frauen aus Gruppe 1 wurden basierend auf der Schwere ihrer Covid-19-Symptome weiter in drei Gruppen eingeteilt: diejenigen mit leichten Symptomen, diejenigen mit mittelschweren Symptomen, die wegen Sauerstoff ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, und diejenigen mit schweren Symptomen, die einen Krankenhausaufenthalt und eine mechanische Beatmung benötigten oder die hatte eine Beteiligung mehrerer Organe. Die Forscher verglichen die Schwere der Covid-19-Symptome mit der Prävalenz, Schwere und Dauer von Müdigkeit.

Primäres Ergebnis

Diese Studie wurde entwickelt, um Prävalenz, Dauer und Risikofaktoren für Müdigkeit bei Frauen zu bewerten, die während der Schwangerschaft an Covid-19 erkrankten.

Wichtigste Erkenntnisse

In G1 berichteten 40,6 % der Frauen, die nachuntersucht wurden, 6 Wochen nach der Diagnose über Müdigkeit, 33,6 % nach 3 Monaten und 27,8 % nach 6 Monaten. Frauen mit schweren Fällen von Covid-19 hatten ein deutlich höheres Risiko (HR=2,43; 95 %-KI, 1,49-3,95; *P*

Besuchen Sie uns auf: natur.wiki